

**MAXIROOT  
INSTRUCCIONES DE USO  
(ETIQUETA)**

<b>CULTIVOS</b>	<b>DOSIS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Chiles y Tomate	1.0 litro / ha	Aplicar después del trasplante y entre cortes cuando existe actividad radicular
Melón, Sandía, Pepino.	0.5 litro / ha	Aplicar después del trasplante y entre cortes cuando existe actividad radicular
Cebolla	1.0 litro / ha	Aplicar después del trasplante o emergencia y al llenado del bulbo
Ajo	0.5 litro / ha	Aplicar después del trasplante o emergencia y al llenado del bulbo
Papaya	2.0 litros / ha	Aplicar después del trasplante y entre cortes cuando existe actividad radicular
Agave	2.5 cc / litro de agua	Aplicar antes del trasplante y al establecerse la época de lluvias cuando existe actividad radicular
Caña de azúcar	1.0 litro / ha	Aplicar a la siembra en plantilla, en socas se aplica cuando existe actividad radicular
Cítricos	1 – 3 litros / ha	Aplicar después del establecimiento y en etapa prefloral junto con la fertilización.
Piña	1 – 3 litros / ha	Aplicar de 1 a 3 meses después del trasplante dependiendo de la variedad
Plátano / Banano	1 – 3 litros / ha	Aplicar al independizarse el hijuelo y cuando existe actividad radicular
Papa	1 – 2 litros / ha	Aplicar al momento de la siembra
Fresa	1.0 litro / ha	Aplicar después del trasplante y al iniciar el 2° flujo floral
Frambuesa, Zarzamora	1.0 litro / ha	Aplicar después del trasplante y cuando existe actividad radicular.
Vid	1-3 litros / ha	Aplicar cuando existe actividad radicular, bajo la hilera
Maíz	1 – 2 litros / ha	Aplicar después de emergencia al aparecer las primeras hojas verdaderas
<b>APLICAR DIRIGIDA A LA BASE DE LA PLANTA, POR MEDIO DEL SISTEMA DE RIEGO O EN BANDA SOBRE AREA RADICULAR</b>		
<b>EN TODOS LOS CASOS DILUIR MAXIROOT EN LA CANTIDAD DE AGUA SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SISTEMA RADICULAR</b>		