

VIGOFORT BASICO
INSTRUCCIONES DE USO
(ETIQUETA)

CULTIVOS	DOSIS	EPOCA DE APLICACION
Maíz	500 cc/ha	A la formación del segundo nudo
Caña	500 cc/ha	A la formación del segundo nudo
Sorgo	500 cc/ha	A la formación del segundo nudo
Fríjol	500–750 cc / ha por aplicación	1ª. Al inicio de la floración. 2ª. De 3 a 4 semanas después
Soya	500–750 cc / ha por aplicación	1ª. Al inicio de la floración. 2ª. De 3 a 4 semanas después
Garbanzo	500–750 cc / ha por aplicación	1ª. Al inicio de la floración. 2ª. De 3 a 4 semanas después
Trigo	500–750 cc / ha por aplicación	Al inicio de macollamiento
Arroz	500–750 cc / ha por aplicación	Al inicio de macollamiento
Mango	1 cc / litro de agua	1ª. Al inicio de la floración. 2ª. Con frutillo tamaño canica
Cítricos	1 cc / litro de agua	1ª. Al inicio de la floración. 2ª. Con frutillo tamaño canica
Aguacate	1 cc / litro de agua	1ª. Al inicio de la floración. 2ª. Con frutillo tamaño canica
Hortalizas	500 cc/ha	Desarrollo vegetativo Repetir cada vez que requiere follaje
Papaya	250 cc/ha	Al inicio de la floración. Repetir cada 15 días.
Plátano	250 cc/ha	Aplicación mensual, mientras tenga desarrollo foliar.